

RESO-PAC®

Инструкция по применению

Первая паста для защиты ран, ...

- которую не нужно удалять
- которая является гидрофильной и медленно растворяется
- которая приклеивается также к влажным и кровоточащим ранам
- которая не отходит
- которая содержит мирру (тканеукрепляющую, вяжущую, кровоостанавливающую)
- которая является также носителем медикаментов, фторида и гемостатика.

Состав: карбоксиметилцеллюлоза, поливинилацетаты, денатурат, коммифора мирра, петролат, смола окиси полиэтилена.

Инструкция по применению:

- 1.) Выдавите необходимое количество Reso-Pac из тубика на увлажненный палец или перчатку. Исполъ-зуйте при этом прилагаемый ключ, который упростит Вам извлечение вязкой пасты из тубика.
- 2.) Скатать Reso-Pac в тонкий рулон (возможно под струей воды) и приклеить в предназначенное место. Расходуйте Reso-Pac экономно, так как материал немного набухает.
- 3.) Под пасту для защиты ран Reso-Pac можно также нанести медикамент, который затем может часами действовать в этом месте.
- 4.) Поверхность нанесенной пасты Reso-Pac должна быть выровнена хорошо увлажненным пальцем или вазелином.

Важно: Укажите своим пациентам на то, что после нанесения Reso-Pac они не должны есть горячие блюда и пить горячие напитки, иначе паста может раствориться.

Reso-Pac – это гидрофильная, состоящая главным образом из целлюлозы, оральная паста для защиты ран, которая также может применяться как носитель медикамента, гемостатика или фторида. Благодаря своему составу, она хорошо клеится к влажной и даже кровоточащей ткани. Reso-Pac прекрасно подходит для покрытия ран после удаления зуба, если рану следует защитить от механических воздействий. Reso-Pac применяется также как носитель медикамента, соответственно, она может применяться, например, при защите ран в рамках лечения антикоагулянтами. Без мастикаций и манипуляций, Reso-Pac защищает рану макс. до 30 часов, но в любом случае, достаточно, чтобы достичь стабильного слоя фибрина на ране. Целесообразным дополнением к Reso-Pac являются продукты Miradont-Gel (гель с питательным микровеществом) и Myzotect (настойка мирра-бензоин), которые оказывают болеутоляющее действие – наносятся до закрытия раны пастой Reso-Pac.

BZHWEU0709

HÄGER & WERKEN GmbH & Co. KG
Postfach/P.O.B. 10 06 54
47006 Duisburg, Germany



T +49 (203) 99 269-0
F +49 (203) 2992 83
www.hagerwerken.de

REF 155 011 (25 g)

REF 155 010 (5 x 25 g)

